

## NÁSLEDNÁ PÉČE A ÚDRŽBA

tradiční zelené střechy se sklonem do 20 stupňů

# SedumTopMat/S5 – vegetační rohože

ředpěstované vegetační rohože na vytlívajícím kokosovém nosiči

U extenzivních zelených střech připadají v úvahu následující úkony péče a údržby, minimálně 2x ročně:

■ **Odstraňování nežádoucí vegetace**

Každoročně je nutné odstraňovat náletové dřeviny a byliny pokud možno i s kořeny a před vysemenění. Odstraněné rostliny je nutné snést ze střechy. Nežádoucí vegetaci je nutné odstraňovat nejen z ozeleněných ploch, ale také z kačírkových pásů, cestiček a přilehlých teras.

■ **Čištění kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných odvodňovacích zařízení**

Kontrolní šachty a vpusti pod nimi je nutné každý rok kontrolovat a čistit od nečistot (mraveniště, špína, listí, vápenaté usazeniny apod.). Profil odtoku nesmí být zúžený. Totéž platí i pro odvodňovací žlaby.

■ **Hnojení**

Extenzivní zelenou střechu doporučujeme hnojit dvakrát ročně. Optimálním obdobím je pozdní duben a brzké září. Hnojení zajišťuje rovnoměrný přísun živin, což vede k prosperitě rostlin. Doporučujeme preferovat hnojiva s řízeným uvolňováním živin. Jedná se zejména o hnojiva s granulami, které uvolňují živiny v závislosti na teplotě a vlhkosti, a které mají relativně přesně stanovenou účinnost.

■ **Zavlažování**

Extenzivní zeleň se po skončení dokončovací údržby, tj. po pokrytí větší než poloviční plochy vegetací a stáří 1 rok, zpravidla již nezavlažuje. Zavlažování není standardně nutné ani při horkém a suchém létě. Výjimkou mohou být: velmi tenkovrstvé skladby pod 7 cm a strmé střechy o tloušťce vrstvy pod 10 cm orientované na jih. V případě období bez srážek trvajících více než 30dnů, je nutné provádět závlivku 2x týdně v objemu 10-15l/m<sup>2</sup>. Zavlažování vegetace v letních měsících, kdy teploty převyšují více než 25°C musí probíhat brzké ráno nebo později večer

■ **Dosévání, resp. dosazování chybějících rostlin, příp. doplňování substrátu**

Při výskytu neporostlých ploch (o velikosti větší než cca 0,5 m<sup>2</sup>), při výskytu eroze na určitých místech je nutné doplnit substrát a dosadit vhodné rostliny v balech, doplnit řízky rostlin Sedum. Vhodným obdobím je duben/květen nebo září/říjen.

■ **Ochrana rostlin**

Chemická ochrana rostlin se smí provádět pouze po konzultaci s odborníkem.

